



Az év tájfajtája 2023

Illmiczi árpa

Az árpa részben takarmánynövény, részben a söriparhoz szükséges malátakészítést szolgálja. Korábban elsősorban az ún. négysoros (szabálytalan hatsoros) típusok őszi változatát használtuk takarmányozásra és inkább a tavaszi termesztésű kétsoros változatot használtuk sörfőzésre. Ma ez a különbség kiegyenlítődni látszik. Közvetlen emberi fogyasztás szempontjából hazánkban kevésbé jelentős (gersli), de csupasz változatát például pótkávé készítéséhez használjuk. A tápiószelei génbankban 4324 különböző árpa található.

Az Illmiczi árpa Cserháti Sándor (1906) leírása szerint: „Mosonymegye Illmicz községének határában régóta termett hazai féleség, mely az orsz. m. kir. növénytermelési állomás kísérletei útján lett ismertté. Magja sohasem lesz oly szép minőségű, mint a nevezetesebb kétsoros árpaké. Igen korán érik, jó talajon bőtermő, szalmája vékony. Az Illmiczi árpa korán érik, a szárazságot jóval jobban tűri, mint az igényesebb féleségek, ezért ezen árpa termelése a mondott viszonyok között határozottan figyelmet érdemel.”



A tápiószelei génbankba 1985-ben került az Illmiczi árpa tájfajta, melyet azóta őrzünk a jövő nemzedékek számára.

A BIOLÓGIAI SOKFÉLESÉG VILÁGNAPJA
2023. MÁJUS 22.

Az év haszonállata

Rézpulyka



Az év tájfajtája

Illmiczi árpa



22 MAY
INTERNATIONAL DAY FOR BIODIVERSITY

From Agreement to Action:
Build Back Biodiversity



AGRÁRMINISZTERIUM



NEMZETI BIODIVERZITÁS-
ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT



Az év haszonállata 2023

Rézpulyka

A pulyka (*Meleagris gallopavo*) eredeti hazája Közép- és Észak-Amerika. Vadon élő őse Észak-Amerika középső területein honos. A vadpulyka jóval kisebb testű, mint házasított rokona, színe leginkább a fekete és sötétbronz pulykához hasonlítható.



A rézpulyka csőre többen sötét, a csőr vége felé világos szaruszínű, szeme sötét mogyorószínű, a fej, az arc, a nyaklebeny, a dudorok és az ormány (szarv alakú húsképződmény) élénkpiros, utóbbi a kakasoknál izgalmi állapotában vérvörös, kékesfehér, majd sötét ibolyaszínbé játszó. Lábuk rózsaszín vagy hússzínű, a körömök világos szaruszínűek vagy fehérek. A kakas tollazatának színe a test elülső részén sötét rézvörös, fehéres szárnyfedő- és faroktollakkal. Alapszínét fakó és fehér harántszívek tarkíthatják. A tojó színe a kakaséhoz hasonló, annál valamivel világosabb.



A *rézpulyka* 1998-tól őshonosként regisztrált fajta, mely jelenleg kizárólag génmegőrzési céllal fenntartott állományokkal rendelkezik. Az állatlétszám kritikus szinten van, mert Magyarországon a törzskönyvezett tojók létszáma nem éri el az 500-at. Megmentésük ezért napjainkban különösen fontos. A gödöllői őshonos haszonállat génbank állományjaiból kistenyésztők, családi gazdaságok tenyésztőjét, keltetőjét vagy naposcsibét vásárolhatnak áprilistól május végéig. Az információk megtekinthetők a www.nbgk.hu oldalon.

